

## মাঘ মাসে কৃষক ভাইদের করণীয়

মাঘ মাসের কনকনে শীতের হাওয়া তার সাথে মাঝে শৈতপ্রবাহ শীতের ঠীকাতে আরো বাড়িয়ে দিয়ে যায়। কথায় আছে মাঘের শীতে বাধ পালায়। বিষু আমাদের কৃষকভাইদের মাঠ হেতে পালানোর কোন সুযোগ নেই। কেননা এ সময়টা কৃষির এক ব্যস্ততম সময়। আর তাই আসুন আমরা সংক্ষেপে জেনে নেই মাঘ মাসে কৃষিতে করণীয় পুরুষপূর্ণ কাজগুলোঃ

- বোরো ধানে এইজেড ও জাত অনুসারে চারা রোপনের ১৫-২০ দিন পর প্রথম কিন্তি, ৩০-৪০ দিন পর দ্বিতীয় কিন্তি এবং ৫০-৫৫ দিন পর শেষ কিন্তি হিসেবে ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ করতে হবে;
- চারা রোপনের ৭-১০ দিনের মধ্যে গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ করতে পারেন। এতে বিদ্যা প্রতি ৫০-কেজি ২০ কেজি গুটি ইউরিয়ার প্রয়োজন হয়;
- চারা রোপণকালে শৈত্য প্রবাহ শুরু হলে কয়েকদিন দেরি করে চারা রোপণ করুন;
- বোরো ধানের চারা রোপনের পর শৈত্যপ্রবাহ দেখা দিলে জমিতে ৫-৭ সেন্টিমিটার পানি ধরে রাখুন;
- বোরো ধানে নিয়মিত সেচ প্রদান, আগাছা দমন, বালাই ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য পরিচর্যা করতে হবে। AWD পক্ষতে সেচ প্রদান করলে পানি সাধারণ হয় ও ফলন বাঢ়ে।
- রোগ ও পোকা থেকে ধান ফসলকে রক্ষা করতে সমর্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা পক্ষতি হ্রয়েগ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে পরিচ্ছম চাষাবাদ, আতপরিচর্যা, যান্ত্রিক দমন, উৎকারী পোকা সংরক্ষণ, ক্ষেত্রে ভালপালা পুতে পাখি বসার ব্যবস্থা করা, আলোর ঝীল এসবের মাধ্যমে ধানফেজেট বালাই মুক্ত করতে হবে;
- এসব পশ্চায় রোগ ও পোকার আক্রমণ প্রতিহত করা না গেলে শেষ উপায় হিসেবে সঠিক বালাইনাশক, সঠিক সময়ে, সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে;

### গম:

- গমের জমিতে যেখানে ধন চারা রয়েছে তা পাতলা করে দিতে হবে;
- গম গাছ থেকে যখন শিথ বের হয় বা গম গাছের বয়স ৫৫-৬০ দিন পর হয় তবে জরুরীভাবে গম ক্ষেত্রে একটি সেচ দিতে হবে। এতে গমের ফলন বৃক্ষ পাবে;
- ভালো ফসলের জন্য দানা গঠনের সময় আরেকবার সেচ দিতে হবে;
- গম ক্ষেত্রে ইন্দুর দমনের কাজটি সকলে সিলে একসাথে করতে হবে;

### ভুট্টা:

- ভুট্টা ক্ষেত্রের গাছের গোড়ার মাটি তুলে দিতে হবে;
- ভুট্টা ফসলে এইজেড ও জাত অনুসারে বীজ গজানোর ২৫-৩০ দিন পর প্রথম কিন্তি,, ৪০-৪৫ দিন পর দ্বিতীয় কিন্তি ইউরিয়া ও এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে।
- ভুট্টার সাথে সাধী বা মিশ্র ফসলের চাষ করে থাকলে মেগুলোর প্রয়োজনীয় পরিচর্যা করতে হবে।
- ভুট্টা ফসলে ফল আর্থিওর্ম পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। কাজেই নিয়মিত মনিটরিং, ক্লাউটিং ও প্রয়োজনে দমন ব্যবস্থা নিতে হবে মনিটরিং এর জন্য ফেরোমন ট্রাপ (একটি প্রতি ৫টি) ব্যবহার করতে হবে।

### আলু:

- আলু ফসলে নাবি খস রোগ বা মড়ক রোগ দেখা দিতে পারে, মড়ক রোগ দমনে দেরি না করে ভায়াবেন এবং ৪৫ অথবা সিকিউর অথবা ইভোফিল নিয়মিত স্প্রে অথবা অনুমোদিত ছ্যাকনাশক মাত্রানুযায়ী প্রয়োগ করতে হবে;
- ভাষাড়া আলু ফসলে মালটিং, সেচ প্রয়োগ, আগাছা দমনের কাজগুলো করতে হবে;
- আলু গাছের বয়স ৯০ দিন হলে শাটির সমান করে গাছ কেটে দিতে হবে এবং ১০ দিন পর আলু তুলে ফেলতে হবে;
- আলু তোলার পর ভালো করে শুকিয়ে বাছাই করতে হবে এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে;

### তেল ফসল:

- সরিখা, তিসি বেশি পাকলে রোদের তাপে ফেটে নিয়ে বীজ পড়ে যেতে পারে, তাই এগুলো ৮০ ভাগ পাকলেই সংগ্রহের ব্যবস্থা নিতে হবে;

### শীতকালীন সবজি:

- বেশি ফলন পেতে শীতকালীন শাকসবজি যেমন ফুলকপি, বীধাকপি, টেমেটো, বেগুন, ওলকপি, শালগম, গাজর, শিম, লাউ, কুমড়া, মটরশুটি এসবের নিয়মিত ধূর নিতে হবে।
- টেমেটো ফসলের মারাত্মক পোকা হলো ফলছিদ্রকারী পোকা। সমর্বিত বালাই দমন পক্ষতে এ পোকা দমন করতে হবে;
- শীতকালে মাটির রস করে যায় বলে সবজি ক্ষেত্রে চাহিদা মাফিক সেচ দিতে হবে।
- গোড়ার মাটি আলগা করে দিতে হবে এবং আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

### মসলা জাতীয় ফসল:

- রোপমুক্ত চারা খৈয়াজের উপরিসার প্রয়োগ, সেচ প্রদান ও অন্যান্য পরিচর্যা করতে হবে।

### আঙ্গ:

- সাধারণত এ সময় আঙ্গ গাছে মুকুল আসার পর থেকে মুল ফোটার পূর্ব পর্যন্ত আক্রান্ত গাছে টিস্ট-২৫০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি অথবা ২ গ্রাম ডাইফেন এবং ৪৫ প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। আবের আকার মটর দানার মতো হলে গাছে ২য় বার স্প্রে করতে হবে;
- এসবয় প্রতিটি মুকুলে অসংখ্য ইপার নিষ্ক দেখা যায়। আঙ্গ গাছে মুকুল আসার ১০ দিনের মধ্যে কিন্তু মুল ফোটার পূর্বেই একবার এবং এর একমাস পর আর একবার প্রতি লিটার পানির সাথে ১.০ মিলি সিমবুস/ফেনম/ডেসিস ২.৫ ইসি মিশিয়ে গাছের পাতা, মুকুল ও ভালপালা ভালোভাবে ডিজিয়ে স্প্রে করতে হবে।

তাছাড়া কৃষির যে কোন সমস্যায় উপজেলা কৃষি অফিস অথবা কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নথরে বা কৃষক বন্ধু সেবার ৩০৩১

নথরে কল করে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে পারেন।

৪

১

১